

78e RÉUNION ANNUELLE DE LA SO.F.C.O.T.

Réunion Annuelle, Paris, novembre 2003.

Arthrodèse sous-talienne mini - invasive par évidement comblement du sinus du tarse : à propos de 55 cas.

Henri LELIEVRE*, Jean -François LELIEVRE*, Mourad KASSAB*

INTRODUCTION :

Les arthrodèses sous-taliennes ont un taux de fusion de 94 %. Elles présentent un risque cutané et neurologique superficiel non négligeable. Nous réalisons depuis 1985 une arthrodèse partielle par évidement comblement du sinus du tarse par un mini-abord. Cette technique permet elle de diminuer la morbidité tout en conservant un taux de fusion maximal ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES :

Nous avons revu les dossiers de 52 patients (55 arthrodèses) opérés par le même opérateur. Tous les patients ont été remis en charge immédiatement dans une botte de marche pour une durée de 10 semaines. Nous avons étudié la vitesse de fusion, l'axe de l'arrière-pied, la survenue de complications et le devenir fonctionnel (score de Kitaoka).

RÉSULTATS :

Une seule arthrodèse n'était pas fusionnée à la dixième semaine. Une nécrose cutanée a été notée chez un patient

**** Service d'Orthopédie et Traumatologie, CHU Pitié Salpêtrière, 47-83, boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris Cedex 13.***